

CONSEILS DE SAISON PARU DANS L'AGRI DU 8 MAI 2009

LA SITUATION DANS LE VIGNOBLE ROMAND

On remarque une certaine hétérogénéité dans l'avancement de la végétation.

Des précipitations ont eu lieu dans toutes les régions en début de semaine dernière (souvent >20 mm de pluie cumulés). Elles ont été plus abondantes en Valais, notamment lors de la journée du 27 avril. Ces précipitations étaient accompagnées d'une nette chute des températures, freinant la croissance de la vigne.

Au 5 mai, le stade F (grappes visibles) était majoritairement observé dans le vignoble. Les secteurs précoces atteignent le stade G (grappes séparées). On peut remarquer une certaine hétérogénéité dans l'avancement de la végétation à l'intérieur d'une même zone, voire d'une même parcelle.

Excoriose : Des symptômes (bois blanc) d'excoriose ont été observés dans certaines parcelles, mais il n'est plus d'actualité d'intervenir spécifiquement. Par contre, les parcelles concernées seront traitées lors du débourrement au printemps prochain.

Rougeot : Les conditions nécessaires à la maturation des apothécies (150 degré-jour au seuil de 8°C calculés à partir du 1er janvier) ont été atteintes en toutes régions. Toutefois, nous conseillons de ne traiter que les zones historiquement concernées par ce champignon.

Mildiou : La somme de température en base 8 (160° jours) pour la germination des oospores sera atteinte dans toutes les régions d'ici la fin de la semaine. Mais les conditions pour l'infection primaire ont été réunies dans les régions précoces après les pluies des 27 et 28 avril derniers. Dans ces situations, la lutte devrait débuter dès maintenant, c'est-à-dire lorsque 80% de la durée d'incubation des oospores sont atteints. Dans les autres régions, il est possible d'effectuer un traitement préventif, avec un produit de contact ou pénétrant, notamment dans les secteurs fortement touchés l'an dernier ou souvent sujet à cette maladie.

Nous vous invitons à suivre l'évolution du mildiou sur le site www.agrometeo.ch. Merci de signaler les premières taches d'huile observées aux stations cantonales.

Oïdium : Même si aucun symptôme n'a été observé dans le vignoble, les conditions sont favorables à ce champignon (journées relativement douces et nuits fraîches). Le stade de sensibilité maximal de la vigne (6 à 8 feuilles étalées) a été atteint ou le sera prochainement. Dans les parchets touchés l'an dernier ou dans les secteurs habituellement sensibles, un traitement contre l'oïdium devrait être réalisé (pousses de 20 à 30 cm). Sinon, la lutte débutera en même temps que la première application anti-mildiou, ou au plus tard lorsque les pousses atteignent 50 - 60 cm de long.

Ravageurs : Des cas d'érinose ont été signalés dans de nombreux secteurs. Il s'agira de porter une attention particulière au printemps prochain et de prévoir un traitement spécifique au débourrement. Pour cette année, un traitement ne sera justifié que s'il y a blocage de la végétation. Dans ce cas, il est possible d'intervenir en utilisant la matière active bromopropylate (Néoron®).

Comme déjà mentionné la semaine dernière, on observe localement en Valais des parcelles bloquées par l'acariose. Dans ces cas-là, il convient d'intervenir rapidement avec un acaricide spécifique (cf. Index phytosanitaire ACW 2009).

Vers de la grappe : Les vols des papillons de première génération se poursuivent bien que leur intensité semble avoir diminué avec la baisse des températures.

Ce conseil de saison est rédigé par ProConseil et les stations et services viticoles romands.