

CONSEILS DE SAISON PARU DANS L'AGRI DU 15 MAI 2009

LA SITUATION DANS LE VIGNOBLE ROMAND

Maladies et ravageurs dans le vignoble romand

Les températures estivales de ces derniers jours favorisent une croissance rapide de la vigne.

Au 11 mai, le stade G (grappes séparées) était majoritairement observé dans le vignoble. Les zones plus précoces atteignent le stade H (boutons floraux séparés).

Maladies : La pression mildiou semble faible en ce début de saison. Toutefois, la maturation des oospores est acquise dans toutes les régions. Les conditions pour l'infection primaires pourraient être réunies lors de la prochaine pluie.

Rappelons que l'infection primaire a eu lieu le 27 avril dans les secteurs précoces du Valais, dans le Chablais (à Yvorne) et dans le vignoble de Troinex dans le canton de Genève.

Nous vous invitons à suivre l'évolution du mildiou dans la région qui vous intéresse sur le site www.agrometeo.ch.

Les intervalles de traitements sont à adapter en fonction du mode d'action du produit, de la croissance de la vigne et de la pression des maladies. En cas de forte croissance, les intervalles entre deux traitements seront de huit jours pour les contacts, dix jours pour les pénétrants et de douze jours pour les systémiques.

Quant à l'oïdium, aucun symptôme n'a été observé dans le vignoble. Toutefois, les conditions de températures et d'humidité actuelles semblent favorables au développement de ce champignon. La lutte devra débuter lors du premier traitement antimildiou. Nous vous rappelons que la lutte contre cette maladie est uniquement préventive. Aussi, les premiers symptômes ne sont que difficilement décelables.

Afin de valider le modèle utilisé par Agrométéo, nous vous remercions de signaler toute observation de symptômes de l'une ou l'autre de ces maladies aux stations cantonales.

Ravageurs : Les captures d'eudémis et de cochylis sont observés dans toutes les régions. L'intensité des vols est très variable. Dans tous les cas, il est encore trop tôt pour commencer le contrôle d'occupation des grappes.

Lâcher de typhlodromes: La période de l'ébourgeonnement est un moment propice pour réaliser des implantations de typhlodromes dans les parcelles peu ou pas encore colonisées. Il est conseillé d'utiliser des pousses provenant d'une parcelle suffisamment fournie en typhlodromes (minimum 40% de feuilles occupées) Lors de cette opération, il faut toutefois veiller à ne pas transmettre des ravageurs tels que thrips, érinose, etc.

Ce conseil de saison est rédigé par ProConseil et les stations et services viticoles romands.