

CONSEILS DE SAISON PARU DANS L'AGRI DU 30 JUILLET 2010

INEGALITE FACE A LA PLUIE !

Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont été marquées par une diminution des températures et des précipitations très variables. En effet, on observe des pluies très faibles (moins de 5 litres/m²) sur une partie du vignoble vaudois alors que l'on atteint jusqu'à 30 l/m² en Valais. Notons que le total des précipitations du mois de juillet en Valais, contrairement aux autres régions, se situe dans la moyenne des dernières années.

Au niveau de la phénologie, le stade L (grappes fermées) est toujours celui qui est le plus observé. Des cépages très précoces, ou dans des situations particulières (contre des murs), atteignent la véraison. En se fiant à ces observations, nous pouvons estimer que nous accusons une dizaine de jours de retard par rapport à 2009.

Maladies fongiques

L'oïdium est en général maîtrisé grâce à des applications répétées mais des foyers actifs restent visibles. Aussi, il faut maintenir une bonne protection jusqu'à la véraison car la pression de la maladie est présente dans l'ensemble du vignoble romand.

La situation pour le mildiou est assez hétérogène mais globalement saine. Dans ce cas aussi, il est indispensable de continuer à protéger les vignes avec des applications de fongicides de contact ou pénétrant.

Ravageurs

Les captures d'Eudemis et Cochylis montrent que les vols de 2^{ème} génération touchent à leur fin. Ces observations confirment que les dates recommandées pour les traitements insecticides dans les zones sans confusion permettaient un positionnement adéquat des produits.

Plusieurs cas de présence d'érinose et d'acariose sur les nouvelles pousses ont été signalés ces derniers jours mais il n'y a pas lieu d'intervenir maintenant. Si les symptômes sont très marqués, nous vous recommandons de prévoir un traitement de débourement en 2011.

Divers

Le réglage de la récolte a débuté dans de nombreuses régions. Selon les observations faites, le nombre de baies par grappe est très variable car certaines parcelles ont été passablement touchées par la coulure en particulier pour le Chasselas et, en Valais, le Pinot noir. Nous vous rappelons que la fiche technique Agridea 0.24 peut vous aider à calculer l'estimation du rendement.

Ce conseil de saison est rédigé par ProConseil et les stations et services viticoles romands.